

CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAÇÃO DE PESSOAS EXPOSTAS OU INFECTADOS PELO HIV 2023																		
Grupo alvo	Idade	BCG	HB	Penta/DTP	VIP	Hib	Pneumo 10	Rotavírus	Meningo C	Meningo ACWY	Febre Amarela	Tríplice viral	Varicela	Hepatite A	Pneumo 13	Pneumo 23	HPV	Dupla adulto
Criança	Ao nascer	Dose única ⁽⁴⁾	Dose ao nascer															
	2 meses			1ª Dose	1ª Dose (com VIP)		1ª Dose	1ª Dose ⁽⁴⁾										
	3 meses								1ª Dose									
	4 meses			2ª Dose	2ª Dose (com VIP)		2ª Dose	2ª Dose ⁽⁴⁾										
	5 meses								2ª Dose									
	6 meses			3ª Dose	3ª Dose (com VIP)		3ª Dose											
	9 meses									1ª dose ⁽⁴⁾								
	12 meses						Reforço		1º Reforço			1ª dose ⁽⁷⁾	1ª dose ⁽⁷⁾	1ª Dose				
	15 meses			1º reforço (com Penta)	1º Reforço (com VIP)							2ª dose ⁽⁷⁾	2ª dose ⁽⁷⁾					
	18 meses													2ª Dose				
	2 anos														1ª Dose			
	4 anos			2º reforço (com DTP)	2º Reforço (com VIP)						Reforço ⁽⁴⁾							
	5 anos														1 dose ⁽⁵⁾			
	6 anos								2º Reforço									
	7 anos														2ª Dose			
	9 anos															3 doses ⁽²⁾ Reforço a cada 10 anos ⁽⁵⁾		
Adolescente	10 a 19 anos		4 doses ⁽¹⁾		2 doses ⁽¹⁾				Dose única (11 e 12 anos)	Dose única ⁽⁴⁾	2 doses ^(1,4) (até 29 anos)	2 doses ⁽¹⁾	2 doses ⁽¹⁾					
Adulto	20 a 59 anos		4 doses ⁽¹⁾		2 doses ⁽¹⁾			2 doses + 1 reforço ^(1,3)		Dose única ⁽⁴⁾	1 dose ^(1,4) (30 a 59 anos)	2 doses ⁽¹⁾	2 doses ⁽¹⁾		2 doses ⁽¹⁾	3 doses ⁽²⁾ (até 45 anos)	Reforço a cada 10 anos ⁽⁵⁾	
Idoso	60 anos ou mais		4 doses ⁽¹⁾		2 doses ⁽¹⁾			2 doses + 1 reforço ^(1,3)				2 doses ⁽¹⁾	2 doses ⁽¹⁾		2 doses ⁽¹⁾		Reforço a cada 10 anos ⁽⁵⁾	

(1) Se não tiver recebido o esquema completo na infância.

(2) Esquema para pessoas de 9 a 45 anos 11 meses e 29 dias.

(3) 2 doses com intervalo de 8 semanas entre elas, mais um reforço 5 anos após a ultima dose.

(4) Solicitar a liberação do médico assistente para realização desta vacina. Mais informações no manual do CRIE.

(5) Se não tiver recebido esquema básico com 3 doses previamente deverá iniciá-lo ou completá-lo.

(6) Para crianças que não foram imunizadas préviamente com pneumocócica 10 valente.

(7) Crianças com HIV não devem fazer uso da vacina tetraviral por ainda não estarem disponíveis dados de segurança nessa população.